

หลักฐานข้อ 2 Clinical outcome indicator ของโรคตามประเด็นความเป็นเลิศ

ที่		เป้าหมาย	เม.ย ๖๐	พ.ค ๖๐	มิ.ย๖๐	ก.ค๖๐	ส.ค๖๐	ก.ย๖๐	รวม
๑.	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความเป็นเลิศของจิตเวชผู้สูงอายุที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ Excellence Center (กพร.)	ระดับ๕							รอ สบบส.
๒.	ระดับความสำเร็จของการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุที่มี clinical outcome ที่ดีขึ้นตามเกณฑ์	ระดับ๕							ระดับ๕
	๒.๑ ร้อยละการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุ	ร้อยละ ๕๐							๖๘.๘๕
	๒.๒ ร้อยละของเครือข่ายได้รับความรู้ในการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ	ร้อยละ ๘๐					๑๐๐		๑๐๐
	๒.๓ ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคสมองเสื่อมที่มีอาการทางจิตและพฤติกรรมผิดปกติ มีค่าคะแนน NPI ลดลง ๑ ระดับ ภายในระยะเวลา ๓ เดือน	ร้อยละ ๘๐	๖๖.๖๗	๑๐๐	๑๐๐	๘๗.๕๐	๑๐๐	๑๐๐	๙๒.๓๖
	๒.๔ ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า เข้าสู่ภาวะ Remission ภายใน 3 เดือน	ร้อยละ ๘๐	๑๐๐	๘๘.๘๘	๗๘.๒๖	๙๓.๓๓	๙๐.๐๐	๗๕.๐๐	๘๗.๕๘
	๒.๕ จำนวนผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย	เท่ากับ ๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๓.	ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุหรือญาติที่มีความพึงพอใจต่อระบบบริการจิตเวชในโรงพยาบาลอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด	ร้อยละ ๘๐			๙๔.๖๑				๙๔.๖๑

