

หลักฐานข้อ 2 Clinical outcome indicator ของโรคตามประเด็นความเป็นเลิศ

ที่		เป้าหมาย	เม.ย ๖๐	พ.ค ๖๐	มิ.ย๖๐	ก.ค๖๐	ส.ค๖๐	ก.ย๖๐	รวม
๑.	ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ความเป็นเลิศของจิตเวชผู้สูงอายุที่มี คุณภาพตามเกณฑ์ Excellence Center (กพร.)	ระดับ๕							รอ สบบส.
๒.	ระดับความสำเร็จของการให้บริการ ผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุที่มี clinical outcome ที่ดีขึ้นตามเกณฑ์	ระดับ๕							ระดับ๕
	๒.๑ ร้อยละการเข้าถึงบริการโรค ซึมเศร้าของผู้สูงอายุ	ร้อยละ ๕๐							๖๘.๘๕
	๒.๒ ร้อยละของเครือข่ายได้รับ ความรู้ในการดูแลและส่งต่อผู้ป่วย จิตเวชสูงอายุ	ร้อยละ ๘๐					๑๐๐		๑๐๐
	๒.๓ ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่ได้รับ การวินิจฉัยโรคสมองเสื่อมที่มีอาการ ทางจิตและพฤติกรรมผิดปกติ มีค่า คะแนน NPI ลดลง ๑ ระดับ ภายใน ระยะเวลา ๓ เดือน	ร้อยละ ๘๐	๖๖.๖๗	๑๐๐	๑๐๐	๘๗.๕๐	๑๐๐	๑๐๐	๙๒.๓๖
	๒.๔ ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการ วินิจฉัยโรคซึมเศร้า เข้าสู่ภาวะ Remission ภายใน 3 เดือน	ร้อยละ ๘๐	๑๐๐	๘๘.๘๘	๗๘.๒๖	๙๓.๓๓	๙๐.๐๐	๗๕.๐๐	๘๗.๕๘
	๒.๕ จำนวนผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุที่ เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย	เท่ากับ ๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๓.	ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุหรือ ญาติที่มีความพึงพอใจต่อระบบบริการ จิตเวชในโรงพยาบาลอยู่ในระดับ มากถึงมากที่สุด	ร้อยละ ๘๐			๙๔.๖๑				๙๔.๖๑

